



Genérico: **Adenosina 6mg. (Sol. Inyectable).**  
Fórmula: **Adenosina 6mg/2ml.**

**ALVOLDEN Sol. Iny. c/6 FCO. AMP. 6 MG/2 ML.**

**Indicación Terapéutica:**

Antiarrítmico y vasodilatador coronario. Se usa en la conversión rápida en el ritmo sinusal de taquicardias paroxísticas supraventriculares, incluyendo aquellas que se asocian a una vía accesoria (síndrome de Wolff-Parkinson-White). Auxiliar en el diagnóstico de taquicardias supraventriculares de complejos fino o anchos. Aunque la adenosina no es eficaz en el tratamiento del aleteo auricular (flutter), de la fibrilación auricular y de las taquicardias ventriculares, el retardo en la conducción auriculoventricular puede facilitar el análisis de la actividad auricular.



P.Pub. **\$ 4,650.00** Codigo: **226021** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**



Genérico: **Ropivacaína 40mg. (Sol. Inyectable).**  
Fórmula: **Ropivacaína 40mg/20ml.**


**NOCLORAPIN Sol. Iny. c/5 AMPTAS. 40 MG/20 ML. (2 MG/ML.)**

**Indicación Terapéutica:**

Ropivacaína es un anestésico local moderno con aplicaciones en el campo de la anestesia y/o analgesia con diversas técnicas en diferentes escenarios clínicos. Escenario Anestésico – Quirúrgico: Diversas cirurgías de especialidades como: Cirugía General, Gineco-Obstétrica, Ortopedia y Traumatología, Oncología, Cardiovascular, Plástica y Reconstructiva, Pediátrica, Dermatológica, Urológica, etc. Escenario de Dolor Agudo y Crónico: En procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, a dosis analgésicas, ya sea con administraciones únicas, en bolos, o con infusiones continuas, en casos de dolor perioperatorio, en pacientes politraumatizados, en maniobras invasivas, en puntos gatillo, en secuelas y síndromes dolorosos, etc.



P.Pub. **\$ 1,830.00** Codigo: **226003** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**



Genérico: **Ropivacaína 150mg. (Sol. Inyectable).**  
Fórmula: **Ropivacaína 150mg/20ml.**

**NOCLORAPIN Sol. Iny. c/5 AMPTAS. 150 MG/20 ML. (7.5 MG /ML.)**

**Indicación Terapéutica:**

Idem.



P.Pub. **\$ 2,550.00** Codigo: **226004** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**



Genérico: **Dexmedetomidina.**  
Fórmula: **Dexmedetomidina 200mcg/2ml.**

**DEMESYNT Sol. Iny. c/5 FCO. AMP. 200 MCG/2 ML.**

**Indicación Terapéutica:**

Indicada para la sedación de pacientes inicialmente intubados y con ventilación mecánica asistida durante el tratamiento en unidades de cuidados intensivos. Debe administrarse mediante infusión continua durante no más de 24 horas. Ha demostrado ser eficaz y seguro para lograr una adecuada sedación en pacientes sometidos a ventilación mecánica asistida cuando se administra antes, durante o después de la extubación traqueal. También está indicado en pacientes no intubados para lograr un estado de sedación consciente durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.



P.Pub. **\$ 2,130.80** Codigo: **226002** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**



Genérico: **Amifostina 500mg. (Sol. Inyectable).**  
Fórmula: **Amifostina 500mg/9.7ml. (Para infusión intravenosa).**


**FALVIN Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 500 MG/9.7 ML.**

**Indicación Terapéutica:**

Indicado como agente protector contra la toxicidad hematológica inducida por agentes quimioterapéuticos que se unen al ADN (agentes alquilantes clásicos como ciclofosfamida y agentes alquilantes no clásicos como mitomicina C y análogos de platino); como agente protector contra toxicidad no hematológica aguda y acumulativa (nefrotoxicidad, neurotoxicidad y ototoxicidad) asociada a la terapia basada en platino; y para proporcionar una mejor adherencia a estos tipos de regímenes quimioterapéuticos. También se indica para reducir el riesgo de infección asociado a neutropenia (por ejemplo, fiebre neutropénica) debido a la utilización de regímenes combinados de ciclofosfamida y cisplatino en pacientes con carcinoma de ovario avanzado (FIGO estadio III o IV). Protege a los pacientes con tumores sólidos avanzados, originarios de células no germinales, de la nefrotoxicidad del cisplatino y regímenes que contienen platino en los que las dosis unitarias van desde 60-120 mg/m<sup>2</sup>, en combinación con medidas de hidratación adecuadas. Se utiliza junto con radioterapia fraccionada estándar, para protección contra xerostomía aguda y tardía en cáncer de cabeza y cuello.



P.Pub. **\$ 7,649.00** Codigo: **226024** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**



Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.  
\*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.

**A** Productos que se pueden comercializar a tercera, más el descuento otorgado al cliente.

**B** Productos que se pueden comercializar a precio farmacia, más 20% de descuento.

**C** Productos que se pueden comercializar sólo a precio farmacia, sin descuento adicional.

**D** Productos que se pueden comercializar sólo a tercera, sin descuento adicional.