



Genérico: **Insulina Glargina (Acción prolongada).**

Fórmula: Cada mL contiene: Insulina glargina 3.64mg. equivalente a 100 UI de insulina humana.

INSULINA GLARGINA (Amsa) Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 10 ML. 100 UI.

RED FRÍA, CONSÉRVESE ENTRE 2 y 8 °C

Indicación Terapéutica:

La insulina Glargina se usa para tratar la diabetes mellitus tipo 1 (afección en la que el cuerpo no produce insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). También se usa para tratar a las personas con diabetes mellitus tipo 2 (afección en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre) que necesitan insulina para controlar la diabetes. **Esta insulina de acción prolongada comienza a actuar en alrededor de 1 hora y dura de 20 a 26 horas.**



P.Pub. **\$600.00** Codigo: **487788** Estado: **ACTIVO** Tipo: **D**

Comparar con:



LANTUS / Sanofi



Genérico: **Insulina Regular (Acción rápida).**

Fórmula: Cada mL contiene: Insulina humana (Origen ADN recombinante) 100 UI.

INSULINA HUMANA Rpda/Reg. Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 10 ML. 100 UI.

RED FRÍA, CONSÉRVESE ENTRE 2 y 8 °C

Indicación Terapéutica:

Está indicada para: tratamiento de diabetes tipo I; tratamiento de diabetes tipo II, que no ha podido ser controlada adecuadamente con dieta, ejercicios e hipoglicemiantes orales; estabilización inicial de pacientes diabéticos con cetoacidosis, síndrome hiperosmolar no cetónico, y durante períodos de estrés tales como infecciones severas o cirugías mayores en pacientes diabéticos; tratamiento de diabetes gestacional. **La insulina de acción rápida regular comienza a actuar en 30 a 60 minutos y dura de 5 a 8 horas.**



P.Pub. **\$302.54** Codigo: **486401** Estado: **ACTIVO** Tipo: **D**

Comparar con:



HUMULIN R / Lilly



NOVOLIN R / NovoNordisk



Genérico: **Insulina Nph/Isófana (Acción intermedia).**

Fórmula: Cada mL contiene: Insulina humana isófana (Origen ADN recombinante) 100 UI.

INSULINA ISÓFANA Int/Nph. Susp. Iny. c/1 FCO. AMP. 10 ML. 100 UI.

RED FRÍA, CONSÉRVESE ENTRE 2 y 8 °C

Indicación Terapéutica:

Está indicada para: tratamiento de diabetes tipo I; tratamiento de diabetes tipo II, que no ha podido ser controlada adecuadamente con dieta, ejercicios e hipoglicemiantes orales; estabilización inicial de pacientes diabéticos con cetoacidosis, síndrome hiperosmolar no cetónico, y durante períodos de estrés tales como infecciones severas o cirugías mayores en pacientes diabéticos; tratamiento de diabetes gestacional. **La insulina de acción intermedia (como la insulina NPH/Isófana) comienza a actuar en 1 a 3 horas y dura de 12 a 16 horas.**



P.Pub. **\$322.89** Codigo: **486403** Estado: **ACTIVO** Tipo: **D**

Comparar con:



HUMULIN N / Lilly



NOVOLIN N / NovoNordisk



Genérico: **Osetamivir (Susp. Oral).**

Fórmula: **Osetamivir 360mg/60ml. (6mg/1ml.).**

OSELTAMIVIR (PharmaGen) SUSP. 60 ML. 6 MG.

Indicación Terapéutica:

Osetamivir se utiliza para tratar algunos tipos de infección por influenza ("gripe") en adultos, niños y bebés (mayores de 2 semanas de edad) que han tenido síntomas de gripe no más de 2 días. Este medicamento también se utiliza para prevenir algunos tipos de influenza en adultos y niños (mayores de 1 año de edad) cuando han pasado algún tiempo con alguien que tiene gripe o cuando hay un brote de gripe. Osetamivir pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la neuraminidasa. Funciona por medio de detener la propagación del virus de influenza en el cuerpo. Osetamivir ayuda a disminuir el tiempo que duran los síntomas de gripe como nariz tapada o goteo de nariz, dolor de garganta, tos, dolor muscular o de las articulaciones, cansancio, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos.



P.Pub. **\$ 534.00** Codigo: **664803** Estado: **ACTIVO** Tipo: **B**

Comparar con:



TAMIFLU / Roche



SELTAFERON / Liomont



Genérico: **Osetamivir (Caps. Orales).**

Fórmula: **Osetamivir 75mg/1 Tableta.**

OSELTAMIVIR (PharmaGen) c/10 CAPS. 75 MG.

Indicación Terapéutica:

Osetamivir se utiliza para tratar algunos tipos de infección por influenza ("gripe") en adultos, niños y bebés (mayores de 2 semanas de edad) que han tenido síntomas de gripe no más de 2 días. Este medicamento también se utiliza para prevenir algunos tipos de influenza en adultos y niños (mayores de 1 año de edad) cuando han pasado algún tiempo con alguien que tiene gripe o cuando hay un brote de gripe. Osetamivir pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la neuraminidasa. Funciona por medio de detener la propagación del virus de influenza en el cuerpo. Osetamivir ayuda a disminuir el tiempo que duran los síntomas de gripe como nariz tapada o goteo de nariz, dolor de garganta, tos, dolor muscular o de las articulaciones, cansancio, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos.



P.Pub. **\$ 518.00** Codigo: **660501** Estado: **ACTIVO** Tipo: **B**

Comparar con:



TAMIFLU / Roche



SELTAFERON / Liomont



Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.

