



Genérico: **Metoclopramida.**  
Fórmula: **Metoclopramida 20mg/1 Tableta.**

## METOCLOPRAMIDA (Avivia) c/20 TABS. 10 MG.

### Indicación Terapéutica:

La metoclopramida se utiliza para aliviar los síntomas provocados por el vaciamiento lento del estómago en personas que tienen diabetes. Estos síntomas incluyen náuseas, vómitos, acidez estomacal, pérdida del apetito y una sensación de saciedad que permanece mucho tiempo después de las comidas. La metoclopramida inyectable también se utiliza para prevenir las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia o que pueden ocurrir después de la cirugía. La metoclopramida también se utiliza a veces para vaciar los intestinos durante determinados procedimientos médicos. La metoclopramida pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes procinéticos. Actúa acelerando el movimiento de los alimentos a través del estómago y de los intestinos.



P.Pub. **\$60.58** Código: **321285** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



PLASIL / Sanfer



Genérico: **Pravastatina.**  
Fórmula: **Pravastatina 10mg/1 Tableta.**

## PRAVASTATINA (Avivia) c/30 TABS. 10 MG.

### Indicación Terapéutica:

Indicada en el tratamiento en pacientes con alta concentración de colesterol sérico y factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Junto con su uso debe incluirse una dieta restringida en grasas saturadas y colesterol.



P.Pub. **\$228.00** Código: **321286** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



PRAVACOL / Bristol M.S.



Genérico: **Cabergolina.**  
Fórmula: **Cabergolina 0.5mg/1 Tableta.**

## CABERGOLINA (Avivia) c/2 TABS. 0.5 MG.

### Indicación Terapéutica:

Inhibición/supresión de la lactancia fisiológica: Está indicado para 1) la inhibición de la lactancia fisiológica, inmediatamente después del parto y 2) supresión de la lactancia establecida. Tratamiento de trastornos hiperprolactinémicos que incluyen disfunciones tales como amenorrea, oligomenorrea, anovulación y galactorrea. También está indicado en pacientes con adenomas pituitarios secretores de prolactina (micro y macroprolactinomas), hiperprolactinemia idiopática o síndrome de silla turca vacía con hiperprolactinemia asociada, que representan las patologías básicas subyacentes que contribuyen a las manifestaciones clínicas antedichas.



P.Pub. **\$687.00** Código: **321282** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



DOSTINEX / Pfizer



Genérico: **Acemetacina.**  
Fórmula: **Acemetacina 90mg/1 Tableta.**

## ACOMETACINA (Avivia) c/14 CAPS. 90 MG.

### Indicación Terapéutica:

Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica. Indicado en el Dolor y limitación de la movilidad asociados con: padecimientos articulares degenerativos, columna vertebral, ataques agudos de gota. Inflamación de articulaciones, músculos o tendones, tendovaginitis y bursitis, etc.



P.Pub. **\$399.00** Código: **850352** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



RANTUDIL Retard / Meda



Genérico: **L-Ornitina L-Aspartato.**  
Fórmula: **L-Ornitina/L-Aspartato 3g/1 Sobre.**

## L-ORNITINA/L-ASPARTATO (Avivia) Granulado c/10 SOBS. 3 G.

### Indicación Terapéutica:

Estados de hiperamonemia secundarios a alteraciones hepáticas agudas y crónicas. Encefalopatía hepática, Cirrosis hepática, Hepatitis crónica, Hígado graso.



P.Pub. **\$650.00** Código: **321281** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



HEPA-MERZ / Merz Pharma



Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.

\*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

La Fórmula de la Distribución



Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.

