



Genérico: **Naproxeno+Lidocaína.**
Fórmula: **Naproxeno 10g+Lidocaína 2g/100g.**

LUMBOXEN GEL "Rosa" TUBO c/35 G. 10/2 G.

Indicación Terapéutica:

Analgésico anti-inflamatorio utilizado para el tratamiento de los trastornos músculo-esqueléticos que pueden causar limitación funcional, tales como golpes, dolor muscular agudo, dolor de espalda, cuello, manos, torceduras, dolor articular y tendinoso.



P.Pub. **\$ 126.00** Código: **914011** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



ULTRA-BENGUE / GenommaLab



Genérico: **Naproxeno+Lidocaína.**
Fórmula: **Naproxeno 10g+Lidocaína 2g/100g.**

LUMBOXEN GEL "Azul" TUBO c/35 G. 10/2 G.

Indicación Terapéutica:

Idem.



P.Pub. **\$ 126.00** Código: **685026** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



ULTRA-BENGUE / GenommaLab



Genérico: **Naproxeno+Lidocaína.**
Fórmula: **Naproxeno 10g+Lidocaína 2g/100g.**

LUMBOXEN GEL "Rojo" TUBO c/35 G. 10/2 G.


Indicación Terapéutica:

Idem.



P.Pub. **\$ 126.00** Código: **985028** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



ULTRA-BENGUE / GenommaLab



Genérico: **Betahistina 24mg.**
Fórmula: **Betahistina 24mg/1 Tableta.**

BITENVER c/30 TABS. 24 MG.

Indicación Terapéutica:

Tratamiento del vértigo asociado al síndrome de Ménière. trastorno que se caracteriza por presentar los siguientes síntomas: vértigos (con náuseas y vómitos), pérdida de audición y acúfenos (sensación de ruido dentro del oído).

BITENVER (Maver) c/30 TABS. 24MG. \$ 270.00
SERC (Abbott) c/30 TABS. 24 MG. \$ 955.60
AHORRO 72 %



P.Pub. **\$ 270.00** Código: **914014** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



SERC / Abbott



SAFINOS / Grunenthal



Genérico: **Itoprida.**
Fórmula: **Itoprida 50mg/1 Tableta.**

LAPRIVER c/30 TABS. 50 MG.

Indicación Terapéutica:

Está indicado principalmente para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) erosiva y no erosiva, particularmente aquella asociada al reflujo duodeno-gastroesofágico, en la dispepsia funcional de acuerdo a los criterios diagnósticos de Roma II, tipo dismotilidad y tipo inespecífico o de acuerdo a Roma III, síndrome de malestar post-prandial y síndrome de dolor epigástrico, así como en la gastroparesia idiopática y diabética. Como terapia coadyuvante en algunos casos de síndrome de intestino irritable (SII), particularmente en la variante estreñimiento (Roma II y Roma III) y en algunos casos de pacientes con estreñimiento crónico funcional. También es útil en el alivio de algunos síntomas gastrointestinales ocasionales, tales como la distensión abdominal, anorexia, plenitud postprandial, dolor o malestar abdominal por acidez y como coadyuvante en el control de la náusea y/o vómito.

LAPRIVER (Maver) c/30 TABS. 50MG. \$ 270.00
DAGLA (Takeda) c/30 TABS. 50 MG. \$ 473.00
AHORRO 43 %



P.Pub. **\$ 270.00** Código: **914013** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



DAGLA / Takeda



TALNESIS / Chinoin

Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.

